NOTE X.

TROIS ESPÈCES NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES LONGICORNES DE SUMATRA

DÉCRITES PAR

J. W. VAN LANSBERGE.

1. *Epepeotes Schlegelii*, nov. spec. ♂ et ♀.

Fuscus, capite thoraceque trilineatis, elytris testaceo-irroratis, maculis septem majoribus, impressis, albis, ornatis. — Long. 35 mm.

De taille supérieure à celle des autres espèces, brun foncé, couvert d'une pubescence testacée très fine, disposée en petites taches sur les élytres. Derniers articles des antennes de nuance plus claire.

Tête ornée de trois lignes jaunâtres, continuées sur le prothorax. — Celui-ci aussi long que large, ridé en avant, inégal sur le disque, granulé en avant du bord posterieur, lequel est lisse; épines latérales un peu dirigées en haut. — Elytres saillantes aux épaules, fortement granulées à la base, puis couvertes d'une ponctuation espacée, qui disparait vers l'extrémité; celle-ci tronquée, épineuse extérieurement, subépineuse à l'angle sutural; chacune portant au milieu de la base une tache enfoncée ronde, recouverte d'un enduit blanchâtre, vers le milieu quatre taches analogues, allongées, placées en échiquier et vers le tiers postérieur trois autres disposées une et deux.

Dessous du corps et pattes densément recouverts de pubescence jaunâtre. Articles 3 et 4 des antennes blancs à la base.

La femelle a le prothorax plus étroit et les élytres plus larges, avec la suture plus distinctement épineuse.

Cette belle espèce, que je me plais à dédier à la mémoire du célèbre directeur du Musée de Leyde, a un facies et une coloration un peu différents de ceux des autres *Epepeotes*, mais elle a complètement les caractères du genre et il ne peut donc être question de l'en séparer.

La femelle a été envoyée au Musée de Leyde des environs de Solok (Sumatra) par Mr. J. H. Schagen van Leeuwen. Quant au mâle il provient des chasses de Mr. Beccari et il se trouve dans ma collection grâces à la libéralité du Musée de Gênes.

2. *Ephies palliatus*, nov. spec.

Niger, opacus, glaber, thorace elytrorumque basi rubris; elytris apice amplioribus, rotundatis, juxto suturam sinuatis, hac spinosa. — Long. 21 mm.

Allongé, d'un noir mat, le prothorax et la moitié antérieure des élytres d'un beau rouge; la couleur noire s'étend le long de la suture jusque près de l'écusson, qui est noir; par contre la couleur rouge est continuée sur le bord jusqu'aux deux tiers. Il n'y a de traces de pubescence que sur les derniers segments de l'abdomen. Le dessus du corps est couvert d'une ponctuation très serrée mais peu profonde, qui le fait paraître rugueux. — La tête est petite; le front a au milieu une élévation entourée d'un sillon circulaire. — Le prothorax est médiocrement rétréci en avant, arrondi latéralement, presque droit en arrière, subtuberculé sur le disque, ses bords antérieur et postérieur droits. — Les élytres sont plus larges que le corselet, arrondies aux épaules, un peu sinuées en dessous, puis allant régulièrement en s'élargissant, arrondies à l'extrémité qui est sinuée près de la suture; celle-ci fortement épineuse. Elles ont trois côtes dont l'extérieure est seulement distincte en entier. — Antennes un peu plus longues que la moitié du corps, médiocrement larges, l'article 3 un peu plus long que 1, l'article 4 plus court que les suivants qui sont dilatés et anguleux extérieurement.

Sumatra (Solok). — Envoyé au Musée de Leyde par Mr. J. H. Schagen van Leeuwen.

3. *Ephies Ligystropteroides*, nov. spec.

Niger, supra opacus, subtus velutinus, glaber, thorace elytrisque rufis, illo bimaculato, tuberculato, his apice nigro-violaceis, acuminatis, sutura valde spinosa. — Long. 24 mm.

Très allongé, d'un noir mat en dessus, velouté en dessous, sans autre trace de pubescence qu'une frange de poils courts en dessous des cuisses, le corselet et les élytres d'un rouge de brique, sur le disque du corselet deux taches noires, allongées, l'extrémité des élytres d'un noir violacé. — Tête très petite, fortement étranglée en arrière, l'épistome séparé du front par un sillon transversal, le front formant un bourrelet entre les yeux. — Corselet fortement rétréci en avant, arrondi latéralement, étranglé à la base, qui est légèrement lobée au milieu; sur le disque, sur chacune des taches noires, un petit tubercule velouté. — Elytres huit fois plus longues que le corselet, arrondies aux épaules, puis parallèles, l'extrémité insensiblement atténuée, ogivale, munie d'une longue épine vers l'angle sutural, ornées de trois côtes, dont les deux intérieures très prononcées à la base, mais disparaissant vers les deux tiers. — Antennes très courtes, l'article 1 court, arqué, l'article 3 d'égale grandeur, pyriforme, l'article 4 excessivement court, le 5me un peu plus long, les suivants plus allongés, subégaux, tous très larges, foliacés.

Sumatra (Serdang). — Don du Dr. B. Hagen. — Musée de Leyde.

Brummen, Février 1884.